

ИНСТРУКЦИЯ КЛИОРОН®

Состав лекарственного средства

действующее вещество: хлоргексидин;

1 суппозиторий содержит 20% раствор хлоргексидина диглюконат в пересчете на хлоргексидина диглюконат 16 мг;

вспомогательные вещества: макрогол 1500, макрогол 400.

Лекарственная форма

Суппозитории вагинальные от белого до белого с желтоватым оттенком цвета, шарообразной формы. Допускается мраморность поверхности.

Фармакологические

АО «Лекхим-Харьков», 61115, г.. Харьков, ул. 17 Партсъезда, 36.

Фармакотерапевтическая группа

Противомикробные и антисептические средства, применяемые в гинекологии. Код АТС G01A X.

Хлоргексидина диглюконат оказывает быстрое и выраженное действие на грамположительные и грам- бактерии, дрожжи и дерматофиты: *Treponema pallidum*, *Chlamidia spp.*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Trichomonas vaginalis*. К препарату слабо чувствительны некоторые штаммы *Pseudomonas spp.*, *Proteus spp.*. Нечувствительны к препарату кислотоустойчивые формы бактерий, споры бактерий, грибы, вирусы.

При интравагинальном применении практически не всасывается, системного действия не оказывает.

Показания для применения

Профилактика венерических заболеваний (сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, уреаплазмоз) и инфекционно-воспалительных осложнений в акушерстве и гинекологии (перед оперативным лечением гинекологических заболеваний, перед родами и абортом, до и после установки внутриматочной спирали, до и после диатермокоагуляции шейки матки, перед внутриматочными исследованиями).

Лечение бактериального вагиноза, кольпита, эрозии шейки матки.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение в период беременности или кормления грудью

Не противопоказано.

Дети

Опыта применения нет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами

Не влияет.

Способ применения и дозы

Препарат применяют интравагинально. Перед применением суппозиторий освобождают от контурной упаковки.

Лечение: по 1 суппозиторию 2 раза в сутки в течение 7-10 дней в зависимости от характера заболевания. При необходимости возможно продление курса лечения до 20 дней.

Профилактика венерических заболеваний: применяют однократно по 1 суппозиторию не позднее чем через 2 часа после полового акта.

Беременность. Учитывая степень выраженности инфекционного процесса, данные бактериологических исследований, угрозу прерывания беременности, Клиорон по 1 суппозиторию 1 или 2 раза в день в качестве монотерапии или в составе комплексной терапии. Длительность применения - от 5 до 10 дней.

При кормлении грудью препарат назначают в обычных рекомендованных дозах.

Передозировка

Передозировка и токсические эффекты при применении препарата не выявлены.

Побочные эффекты

Возможны аллергические реакции, зуд в месте введения суппозитория.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Клиорон нельзя применять вместе с детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза), а также с мылом.

Срок годности

2 года. Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.

Упаковка

По 5 суппозитория в блистере, по 2 блистера в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.